

# BREVET PROFESSIONNEL PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

SESSION 2021

SOUS ÉPREUVE E3B – U32

## COMMENTAIRE TECHNIQUE ÉCRIT

	NOTE / BARÈME
RECEVABILITÉ	/ 1 point
ANALYSE DES SPÉCIALITÉS	/ 7 points
ANALYSE DU OU DES DISPOSITIF(S)	/ 3 points
ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION	/ 12 points
FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE	/ 1 point
CONSEILS AU PATIENT	/ 16 points
TOTAL	/ 40 points
NOTE	/ 20 points

Arrondie au ½ point supérieur

## INSTRUCTIONS AUX CORRECTEURS

Le barème est fixé nationalement.

Avant de débiter la correction des copies, les membres de la commission d'harmonisation se réuniront, afin de prendre connaissance du corrigé et du barème à appliquer. Les réponses cohérentes et adaptées ne figurant pas dans le corrigé seront également étudiées lors de la commission.

Afin d'assurer l'ÉQUITÉ de notation de TOUS les candidats, la répartition des points attribués à chaque partie, ainsi que les pénalités prévues, devront être respectées.

La note 0 sera attribuée uniquement :

- en cas de contre-indication absolue ou interaction médicamenteuse majeure non signalée ou signalée à tort,
- en cas de posologie anormale non signalée ou signalée à tort. (une posologie est considérée comme anormale quand la dose maximale par prise et/ou par 24 heures est dépassée par rapport aux doses maximales indiquées par la Pharmacopée Française).

Néanmoins la note 0 sera attribuée à une partie de l'épreuve dans les cas suivants :

### 1 : À la partie 4 (analyse globale de la prescription)

- en cas de délivrance de toutes les spécialités prescrites ou d'un choix dans la délivrance, suite à un signalement à juste titre d'une erreur majeure,
- en cas de délivrance d'une quantité anormale d'une ou plusieurs spécialité(s) susceptible(s) de mettre en danger la vie du patient,
- en cas de non délivrance d'une ou de plusieurs spécialité(s) prescrite(s), devant l'être,
- en cas de non traitement de la délivrance.

### 2 : À la partie 4.1 (but thérapeutique)

- en cas d'indication d'un but thérapeutique sans aucun lien avec la prescription.

### 3 : Aux parties 4 et 6 (conseils au patient)

- dans le cas où il n'y a pas d'erreur majeure et que le candidat ne traite pas l'analyse globale par stratégie.

La note 0 ne peut pas être attribuée lorsque les conclusions de l'analyse sont exactes, mais non justifiées.

Une interaction médicamenteuse d'un autre niveau que contre-indiquée, non signalée ou signalée à tort, ou une durée de traitement thérapeutique et non législative incorrecte, non relevée ou relevée à tort n'entraînent pas 0 au CTE.

Les réponses attendues, données dans une autre rubrique que celle prévue dans le corrigé, devront être impérativement prises en compte, en étant notées une seule fois.

La commission d'harmonisation de chaque académie pourra attribuer 1 point à chaque conseil pertinent (même non listé dans le corrigé), dans le respect du barème pour les conseils liés aux spécialités et à la (aux) pathologie(s).

Les conseils inadaptés ou aberrants seront sanctionnés par le retrait au maximum de 2 points sur la rubrique 6 « Conseils au patient ».

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C 21SP-BP PP U32	Session 2021	<b>CORRIGE</b>
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 2/6

# 1. RECEVABILITÉ (1 point)

L'ordonnance est recevable.

(1pt)

# 2. ANALYSE DES SPECIALITÉS (7 points)

NOM Dosage D.C.I. FORME GALENIQUE	Liste et / ou législation particulière	Classe pharmacologique ou thérapeutique précise	INDICATION THERAPEUTIQUE SUCCINTE	UTILISATION ET/OU MODE D'EMPLOI
<b>DAFALGAN CODEINE®</b> <i>Paracétamol 500 mg Codéine phosphate 30 mg Comprimé pelliculé</i>	Liste I	<u>Antalgique périphérique,</u> <u>analgésique opioïde</u> ; système nerveux central Antalgique, antipyrétique (paracétamol) Antalgique central (codéine) (0,5pt)	Traitement des douleurs aiguës d'intensité modérée (qui ne peuvent pas être soulagées par d'autres antalgiques) (0,5pt)	Prendre les comprimés tels quels avec un verre d'eau (0,5pt)
<b>ALGESAL SURACTIVE®</b> <i>Acide salicylique 6,54 g Diéthylamine 3,46 g Myrtécaïne 1 g Crème, tube de 100g</i>	Hors liste	Topique à visée <u>antalgique</u> Association de salicylate et de diéthylamine à visée antalgique et myrtécaïne anesthésique local (0,5pt)	<u>Traitement local</u> d'appoint des douleurs d'origine tendino- ligamentaire (accepter entorse) (0,5pt)	Appliquer <u>en</u> <u>massages locaux</u> sur la région douloureuse (0,5pt) jusqu'à <u>pénétration</u> complète du produit (0,5pt) Se <u>laver les mains</u> après utilisation (0,5pt)
<b>DOLIPRANE®</b> <b>500 mg</b> <i>Paracétamol 500 mg Comprimé</i>	Hors liste	<u>Analgésique et</u> <u>antipyrétique</u> famille des anilides Système nerveux central (0,5pt)	Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée (0,5pt)	Avaler les comprimés tels quels, avec une boisson (eau, lait, jus fruits...) (0,5pt) Espacer les prises de 4 à 6h (4 h minimum) (0,5pt)
<b>LYSANXIA®</b> <i>Prazépam 1,5 g pour 100 ml Solution buvable à 15 mg/ml</i>	Liste I Prescription limitée à 12 semaines	<u>Anxiolytique</u> : système nerveux central Classe des 1-4 <u>benzodiazépines</u> (0,5pt)	Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et / ou invalidantes (0,5pt)	RAS
		2 pts	2 pts	3 pts

### 3. ANALYSE DU DISPOSITIF (3 points)

Genouillère ligamentaire renforcée fermée

#### Description :

Maintien élastique et proprioceptif, renforts stabilisateurs latéraux plastiques (0,5 pt)

Sangles de serrage bilatérales et semi-circulaires pour contrer l'effet garrot (0,5 pt)

Indication : Traitement fonctionnel de l'entorse du genou bénigne à modérée (1pt)

Accepter reprise d'activité après rééducation

#### Conseils :

Prendre la mesure, tour du genou lésé à hauteur de la rotule, genou en légère flexion (0,5pt)

Entretien : lavage à l'eau savonneuse tiède, séchage à plat (0,5pt)

### 4. ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION (12 points)

#### ➤ But thérapeutique

Cette patiente est anxieuse (1pt)  
et souffre d'une entorse du genou (0 ou 1pt)  
très douloureuse. (0,5pt)

#### ➤ Associations bénéfiques

**Association de plusieurs principes actifs dans une même spécialité :**

#### **DAFALGAN CODEINE® :**

Association d'un antalgique central (phosphate de codéine) (0,5pt)

et d'un antalgique périphérique (paracétamol) (0,5pt)

pour une complémentarité et une meilleure prise en charge de la douleur. (0,5pt)

#### **ALGESAL suractivé®** renferme 3 P.A :

Association de deux principes actifs antalgiques : *Acide salicylique*, *Diéthylamine* et d'un principe actif anesthésique *Myrtécaïne* (0,5pt)

qui agissent sur la douleur. (0,5pt)

**Association de plusieurs spécialités pour la prise en charge de la douleur et du dispositif médical**

**DAFALGAN CODEINE® + DOLIPRANE® + ALGESAL®** (0,5pt)

Association d'un traitement antalgique par voie systémique (0,5pt)

à un traitement à usage local pour la prise en charge de la douleur. (0,5pt)

Ce traitement antalgique est complété par le maintien de la partie du membre douloureux grâce à la genouillère ligamentaire **GENU DYNASTAB**. (1pt)

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C21SP-BP PP U32	Session 2021	<b>CORRIGÉ</b>
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 4/6

➤ Interaction médicamenteuse

**Interaction médicamenteuse à prendre en compte** entre **DAFALGAN CODEINE®** (liée à la présence de codéine) et le **LYSANXIA®** (benzodiazépine) **(0,5pt)**  
« risque majoré de dépression respiratoire pouvant être fatale en cas de surdosage »  
et/ou « majoration de la dépression centrale ». **(1pt)**

➤ Conclusion

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure. **(1pt)**

➤ Délivrance

**DAFALGAN CODEINE®** : 1 boîte de 16 comprimés pelliculés **(2pts ou 0)**  
**ALGESAL SURACTIVE®** : 1 tube de crème 100g  
**DOLIPRANE® 500 mg** : 3 boîtes de 16 comprimés  
**LYSANXIA®** : 1 flacon de 20 ml de solution buvable pour le 1<sup>er</sup> mois, à renouveler 1 fois  
**GENOUILLERE GENU DYNASTAB** : 1 boîte

**5. FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE (1point)**

Pour les spécialités listées **DAFALGAN CODEINE®**, **LYSANXIA®**, inscrire la posologie et le mode d'emploi sur les conditionnements. **(1pt)**

**6. CONSEILS AU PATIENT (16 points)**

➤ En lien avec les pathologies

**Entorse** : quatre conseils illustrés attendus **(4x1=4pts)**

- Mettre le genou au repos pour limiter la douleur et favoriser la guérison
- Surélever le genou pour éviter l'œdème
- Porter la genouillère jusqu'à guérison et la reporter si activité sportive
- Appliquer de la glace ou un coussin réfrigéré si œdème
- Envisager des séances de kinésithérapie pour rééduquer l'articulation

**Anxiété** : quatre conseils illustrés attendus **(4x1=4pts)**

- Eviter la consommation excessive d'excitants (thé, café)
- Pour ne pas s'accoutumer aux BZD, se tourner vers la phytothérapie (aubépine, valériane, mélisse), l'homéopathie (passiflora composée)
- Essayer de se détendre : yoga, sorties, bains relaxants avec des huiles essentielles...
- Se faire éventuellement accompagner par un thérapeute
- Se coucher à des heures régulières et respecter un nombre d'heures de sommeil suffisant
- Eviter les écrans (TV, ordinateur...)
- S'occuper dans la journée (lecture, musique, promenade...)

Tout autre conseil pertinent accepté

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C 21SP-BP PP U32	Session 2021	<b>CORRIGE</b>
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 5/6

➤ En lien avec les spécialités

**DAFALGAN CODEINE® et DOLIPRANE® renferment du paracétamol :**

**deux conseils illustrés attendus**

**(2x1=2pts)**

- Informer la patiente de la présence de paracétamol dans les 2 spécialités DOLIPRANE® et DAFALGAN CODEINE®, insister sur le strict respect du plan de prise et de la posologie
- Eviter l'automédication avec d'autres spécialités contenant du paracétamol
- Bien respecter la dose maximale pour éviter l'hépatotoxicité

**DAFALGAN CODEINE® renferme de la codéine : trois conseils illustrés attendus**

**(3x1=3pts)**

- Eviter la prise de boissons alcoolisées qui augmenterait la dépression centrale due au traitement (codéine et prazépam)
- Pour la constipation possible liée à la codéine, adapter l'alimentation (légumes verts, pain au son... et apport hydrique)
- Informer du risque possible de nausées et de vomissements
- Informer la patiente du risque de somnolence et de la baisse de la vigilance rendant dangereuse la conduite d'un véhicule

**ALGESAL® : un conseil illustré attendu**

**(1pt)**

- Peut provoquer des réactions cutanées locales, type eczéma
- Ne pas appliquer sur une peau lésée, les yeux, les muqueuses, ni sous un pansement occlusif

**LYSANXIA® : deux conseils illustrés attendus**

**(2x1=2pts)**

- Prévenir de ne pas interrompre le traitement anxiolytique (**LYSANXIA®**) sans avis médical pour éviter le risque d'effet rebond
- Eviter la conduite automobile après la prise du médicament, car risque de somnolence
- Respecter la prise le soir, avant le coucher, car risque de somnolence diurne
- Eviter la consommation de boissons alcoolisées, car risque de somnolence et de toxicité

Tout autre conseil pertinent accepté

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C 21SP-BP PP U32	Session 2021	<b>CORRIGE</b>
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 6/6