• **Énoncé**

On considère deux suites (u_n) et (v_n) définies par u_0 et v_0 réels strictement positifs donnés et :

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{v_n} \text{ et } v_{n+1} = v_n + \frac{1}{u_n}.$$

Montrer que $u_{18} + v_{18} > 12$

Réponse : Je commence par conjecturer que:

Pour tout $n \geq 1$, on a l'inégalité $u_n + v_n \geq 2 \times a_n$

où (a_n) est la suite définie par $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ et $a_0 = 1$.

Si on prouve cette conjecture alors on aura en particulier ($n=18$):

$$u_{18} + v_{18} \geq 2 \times a_{18} \approx 2 \times 6,26 . \text{ donc } u_{18} + v_{18} > 12$$

En effet, on peut facilement étudier la suite (a_n) :

Tous les termes sont strictement positifs.(récurrence immédiate)

Elle est strictement croissante (car $a_{n+1} - a_n > 0$)

Elle est divergente vers $+\infty$ (sinon la limite L vérifierait $L = L + \frac{1}{L}$).

On peut calculer aisément les premiers termes de cette suite au tableur par exemple:

C2		=B2+1/B2																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	a_n	1	2	2,5	2,9	3,24	3,55	3,83	4,1	4,34	4,57	4,79	5	5,2	5,39	5,58	5,75	5,93	6,1	6,26	6,42	6,58
3																						

Cette suite a un deuxième intérêt : elle est en quelque sorte "minimale".

Plus précisément, nous allons montrer que:

Si (a'_n) est une autre suite définie par la relation $a'_{n+1} = a'_n + \frac{1}{a'_n}$ mais avec $a'_0 > 0$ quelconque différent de 1, alors $2 \leq a_n < a'_n$ pour tout $n \geq 1$:

Preuve par récurrence:

Lemme: La fonction f définie pour $x > 0$ par $f(x) = x + \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0; 1]$ puis croissante sur $[1; +\infty[$. Son minimum est 2 atteint pour $x = 1$.

Initialisation :

D'après le lemme: $a'_1 = a'_0 + \frac{1}{a'_0} > 2 = a_1$ donc la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité:

Supposons $2 \leq a_n < a'_n$ pour un certain rang $n \geq 1$ alors comme f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$ on a $f(2) \leq f(a_n) < f(a'_n)$ donc $2 \leq 2,5 \leq a_{n+1} \leq a'_{n+1}$ donc la propriété est aussi vraie au rang $n+1$.

Conclusion:

On peut donc bien dire que la suite (a_n) est la plus petite de "la famille" (des suites récurrentes définie à l'aide de la fonction f)

Reste à prouver la conjecture:

Je n'arrive finalement pas à formaliser une preuve rigoureuse....(manque un peu de temps et d'idées)

Mais toutes mes simulations au tableur le confirment. (en choisissant au hasard u_0 et v_0 entre 0 et 2, et à coups de CTRL+MAJ+F9, une bonne centaine de fois)