

BREVET PROFESSIONNEL PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

SESSION 2022

SOUS ÉPREUVE E3B – U32

COMMENTAIRE TECHNIQUE ÉCRIT

	NOTE / BARÈME
RECEVABILITÉ	/ 2 points
ANALYSE DES SPÉCIALITÉS	/ 8 points
ANALYSE DU OU DES DISPOSITIF(S)	/ 3 points
ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION	/ 11 points
FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE	/ 1 point
CONSEILS AU PATIENT	/ 15 points
TOTAL	/ 40 points
NOTE	/ 20 points

Arrondie au ½ point supérieur

INSTRUCTIONS AUX CORRECTEURS

Le barème est fixé nationalement.

Avant de débiter la correction des copies, les membres de la commission d'harmonisation se réuniront, afin de prendre connaissance du corrigé et du barème à appliquer. Les réponses cohérentes et adaptées ne figurant pas dans le corrigé seront également étudiées lors de la commission.

Afin d'assurer l'ÉQUITÉ de notation de TOUS les candidats, la répartition des points attribués à chaque partie, ainsi que les pénalités prévues, devront être respectées.

La note 0 sera attribuée uniquement :

- en cas de contre-indication absolue ou interaction médicamenteuse majeure non signalée ou signalée à tort,
- en cas de posologie anormale non signalée ou signalée à tort. (une posologie est considérée comme anormale quand la dose maximale par prise et/ou par 24 heures est dépassée par rapport aux doses maximales indiquées par la Pharmacopée Française).

Néanmoins la note 0 sera attribuée à une partie de l'épreuve dans les cas suivants :

1 : À la partie 4 (analyse globale de la prescription)

- en cas de délivrance de toutes les spécialités prescrites ou d'un choix dans la délivrance, suite à un signalement à juste titre d'une erreur majeure,
- en cas de délivrance d'une quantité anormale d'une ou plusieurs spécialité(s) susceptible(s) de mettre en danger la vie du patient,
- en cas de non délivrance d'une ou de plusieurs spécialité(s) prescrite(s), devant l'être,
- en cas de non traitement de la délivrance.

2 : À la partie 4.1 (but thérapeutique)

- en cas d'indication d'un but thérapeutique sans aucun lien avec la prescription.

3 : Aux parties 4 et 6 (conseils au patient)

- dans le cas où il n'y a pas d'erreur majeure et que le candidat ne traite pas l'analyse globale par stratégie.

La note 0 ne peut pas être attribuée lorsque les conclusions de l'analyse sont exactes, mais non justifiées.

Une interaction médicamenteuse d'un autre niveau que contre-indiquée, non signalée ou signalée à tort, ou une durée de traitement thérapeutique et non législative incorrecte, non relevée ou relevée à tort n'entraînent pas 0 au CTE.

Les réponses attendues, données dans une autre rubrique que celle prévue dans le corrigé, devront être impérativement prises en compte, en étant notées une seule fois.

La commission d'harmonisation de chaque académie pourra attribuer 1 point à chaque conseil pertinent (même non listé dans le corrigé), dans le respect du barème pour les conseils liés aux spécialités et à la (aux) pathologie(s).

Les conseils inadaptés ou aberrants seront sanctionnés par le retrait au maximum de 2 points sur la rubrique 6 « Conseils au patient ».

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C22SR-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 2/6

1. RECEVABILITÉ (2 points)

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la signature du prescripteur. **(2pts ou 0)**

2. ANALYSE DES SPÉCIALITÉS (8 points)

Nom DCI Dosage Forme galénique	Liste et/ou législation particulière	Classe pharmacologique et/ou thérapeutique précise	Indication thérapeutique succincte (dans le cadre de l'ordonnance)	Utilisation et/ou mode d'emploi
FOSFOMYCINE® Fosfomycine 3 g granulés pour solution buvable en sachet	Liste I	Antibiotiques dérivés de l'acide fosfonique (ou antibactériens urinaires) (0,5pt)	Traitement monodose de la <u>cystite aiguë non</u> compliquée (0,5pt)	Dissoudre le contenu du sachet de granulés dans un demi-verre d'eau (0,5pt) à prendre à distance des repas (0,5pt)
SPASFON- LYOC® Phloroglucinol lyophilisat oral à 80 mg	Hors Liste	Antispasmodique musculotrope (0,5pt)	Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des <u>voies</u> <u>urinaires</u> (0,5pt)	Les lyocs sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue. (0,5pt)
RUBOZINC® Zinc 15 mg par gélule	Hors Liste	Autres préparations à usage systémique (0,5pt)	Acné inflammatoire de sévérité mineure et moyenne (0,5pt)	A prendre avec un grand verre d'eau, à distance des repas (0,5pt)
CUTACNYL® 10 % Peroxyde de benzoyle 10 g Gel pour application cutanée	Liste II	Préparation anti acnéique à usage topique (0,5pt)	Acné vulgaire (0,5pt)	Appliquer en fine couche (0,5pt) sur une peau nettoyée et sèche (0,5pt) Appliquer en légers massages jusqu'à pénétration complète (0,5pt) Se laver soigneusement les mains (0,5pt)
		Total : 2 pts	Total : 2 pts	Total : 4 pts

3. ANALYSE DU DISPOSITIF (3 points)

EFFACLAR Gel moussant purifiant

➤ (Présentation : Tube de 200 ml)

➤ Indication : Nettoyage des peaux grasses et sensibles
(peau à tendance acnéique)

(0,5pt)

➤ Propriétés : (2 propriétés attendues)

(2x0,5=1pt)

Purifie la peau : élimine les impuretés et l'excès de sébum

Apaisante et anti-irritante grâce à l'eau thermale

pH 5,5 ; sans savon, sans colorant, sans alcool, sans paraben

➤ Mode d'emploi ou d'utilisation :

(3x0,5=1,5pt)

Faire mousser dans la main avec un peu d'eau

Appliquer sur les zones acnéiques, en massant doucement

Rincer abondamment et sécher en tamponnant

4. ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION (11 points)

➤ But thérapeutique :

(4x0,5=2pts)

Cette patiente souffre d'une cystite aiguë (infection urinaire basse) non compliquée.

Elle présente également une acné inflammatoire (mixte accepté) de sévérité moyenne.

➤ Associations bénéfiques :

FOSFOMYCINE® + SPASFON LYOC®

(0,5pt)

Association d'un antibiotique FOSFOMYCINE® permettant d'éliminer
la bactérie responsable de l'infection urinaire et d'un antispasmodique
SPASFON LYOC® pour calmer les douleurs spasmodiques.

(4x0,5=2pts)

RUBOZINC® + CUTACNYL® + EFFACLAR®

(1pt)

Traitement de l'acné par voie orale RUBOZINC® à effet antiinflammatoire

(1pt)

Traitement de l'acné par voie locale CUTACNYL® à effets antibactérien et
kératolytique

(1pt)

En complément EFFACLAR permet de nettoyer et de purifier la peau.

(0,5pt)

➤ Conclusion :

L'ordonnance ne présente pas d'erreur majeure.

(1pt)

➤ Délivrance :

(2pts ou 0)

FOSFOMYCINE® ARROW 3 g = 1 boîte de 1 sachet

SPASFON LYOC® 80 mg = 1 boîte de 10 lyophilisats

RUBOZINC® 15 mg = 1 boîte de 60 gélules à renouveler 2 fois

CUTACNYL® 10 % = 1 tube de 40 g

EFFACLAR gel moussant purifiant = 1 tube de 200 ml

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C22SR-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 4/6

5. FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE (1 point)

Pour les spécialités listées suivantes : FOSFOMYCINE® et CUTACNYL®, inscrire la posologie et le mode d'emploi sur les conditionnements. **(1pt ou 0)**

6. CONSEILS (illustrés ou justifiés) AU PATIENT (15 points)

➤ En lien avec les pathologies :

CYSTITE : cinq conseils illustrés attendus (5x1=5pts)

- Boire environ 1,5 litre d'eau tout au long de la journée, pour favoriser l'élimination des urines (donc des germes) ;
- Pratiquer une toilette intime avec de l'eau et un savon au pH neutre ou physiologique et après chaque rapport sexuel pour favoriser l'élimination des germes ;
- Éviter les savons antiseptiques, trop irritants, qui déstabilisent la flore ;
- Éviter les bains prolongés en piscine pour éviter la contamination par l'eau ;
- Aller régulièrement aux toilettes (ne jamais se retenir) et s'essuyer d'avant en arrière pour éviter de ramener les germes fécaux vers le méat urinaire ;
- Éviter les pantalons et sous-vêtements trop serrés, les matières synthétiques qui favorisent la macération, préférer les sous-vêtements en coton ;
- Lutter contre la diarrhée et la constipation : la stase fécale génère une fermentation intestinale avec risque de migration vers les voies urinaires ;
- Rééquilibrer la flore intestinale (cure de probiotiques adaptés), surtout en cas de cystites récidivantes ;
- Conseiller la canneberge après le traitement, en prévention d'une récurrence ;
- Acidifier les urines : Vit C, jus de citron...

Toute autre réponse cohérente acceptée

ACNÉ : cinq conseils illustrés attendus (5x1=5pts)

- Ne pas frotter ni triturer les lésions, afin de ne pas favoriser l'apparition de cicatrices permanentes ;
- Ne pas s'exposer au soleil, facteur aggravant de l'acné ;
- Utiliser un produit solaire spécifique pour peau acnéique, d'indice élevé (au minimum 30) ;
- Proscrire l'utilisation de produits décapants, de savon de Marseille, de solutions alcoolisées ;
- Éviter l'utilisation de cosmétiques gras comédogènes non adaptés, de maquillage ;
- Nettoyer le visage en douceur avec des solutions micellaires sans rinçage, des nettoyeurs moussants sans savon, terminer par une pulvérisation d'eau thermale apaisante à éponger délicatement.

Toute autre réponse cohérente acceptée

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C22SR-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 5/6

➤ En lien avec les spécialités :

FOSFOMYCINE® : un conseil attendu

(1pt)

- FOSFOMYCINE® devra être administré à distance des repas : la prise de nourriture peut ralentir l'absorption de FOSFOMYCINE®, avec pour conséquence, de moindres concentrations urinaires.

RUBOZINC® : deux conseils attendus

(2x1=2pts)

- Les gélules doivent être prises avec un grand verre d'eau et en position assise. La position allongée est à éviter pendant les trente minutes suivant la prise des gélules pour éviter le risque d'atteinte digestive haute.
- Espacer les prises, de plus de deux heures si possible, car le bol alimentaire peut modifier la résorption intestinale du médicament.
- Éviter les aliments riches en acide phytique (légumineuses [petits pois, lentilles, soja...], céréales complètes [blé, seigle, avoine...], maïs, noix...) car ils peuvent former des complexes avec le zinc, ce qui diminue son absorption et donc son efficacité.
- Éviter les aliments riches en fer ou en calcium qui peuvent interagir avec le zinc et en diminuer l'absorption.

CUTACNYL® : deux conseils attendus

(2x1=2pts)

- Signaler la possibilité d'apparition après quelques jours de traitement, de sensations de brûlures, d'un érythème et d'une desquamation.
- Procéder à une touche d'essai afin de tester la sensibilité : irritation possible en début de traitement.
- Ne pas s'exposer au soleil (photosensibilisation), utiliser un filtre solaire (ne pas se servir de lampes à UV).
- Éviter le contact avec certaines fibres textiles (risque de décoloration).
- Rincer très soigneusement à l'eau en cas d'application accidentelle sur les muqueuses (yeux, bouche, narines) ou sur les paupières.

Toute autre réponse cohérente acceptée

BP Préparateur en Pharmacie	Code : C22SR-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 6/6