

BREVET PROFESSIONNEL PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

SESSION 2022

SOUS ÉPREUVE E3B – U32

COMMENTAIRE TECHNIQUE ÉCRIT

	NOTE / BARÈME
RECEVABILITÉ	/ 2 points
ANALYSE DES SPÉCIALITÉS	/ 8 points
ANALYSE DU OU DES DISPOSITIF(S)	/ 3 points
ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION	/ 12 points
FORMALITES DE DÉLIVRANCE	/ 1 point
CONSEILS AU PATIENT	/ 14 points
TOTAL	/ 40 points
NOTE	/ 20 points

Arrondie au ½ point supérieur

INSTRUCTIONS AUX CORRECTEURS

Le barème est fixé nationalement.

Avant de débiter la correction des copies, les membres de la commission d'harmonisation se réuniront, afin de prendre connaissance du corrigé et du barème à appliquer. Les réponses cohérentes et adaptées ne figurant pas dans le corrigé seront également étudiées lors de la commission.

Afin d'assurer l'ÉQUITÉ de notation de TOUS les candidats, la répartition des points attribués à chaque partie, ainsi que les pénalités prévues, devront être respectées.

La note 0 sera attribuée uniquement :

- en cas de contre-indication absolue ou interaction médicamenteuse majeure non signalée ou signalée à tort,
- en cas de posologie anormale non signalée ou signalée à tort. (une posologie est considérée comme anormale quand la dose maximale par prise et/ou par 24 heures est dépassée par rapport aux doses maximales indiquées par la Pharmacopée Française).

Néanmoins la note 0 sera attribuée à une partie de l'épreuve dans les cas suivants :

1 : À la partie 4 (analyse globale de la prescription)

- en cas de délivrance de toutes les spécialités prescrites ou d'un choix dans la délivrance, suite à un signalement à juste titre d'une erreur majeure,
- en cas de délivrance d'une quantité anormale d'une ou plusieurs spécialité(s) susceptible(s) de mettre en danger la vie du patient,
- en cas de non délivrance d'une ou de plusieurs spécialité(s) prescrite(s), devant l'être,
- en cas de non traitement de la délivrance.

2 : À la partie 4.1 (but thérapeutique)

- en cas d'indication d'un but thérapeutique sans aucun lien avec la prescription.

3 : Aux parties 4 et 6 (conseils au patient)

- dans le cas où il n'y a pas d'erreur majeure et que le candidat ne traite pas l'analyse globale par stratégie.

La note 0 ne peut pas être attribuée lorsque les conclusions de l'analyse sont exactes, mais non justifiées.

Une interaction médicamenteuse d'un autre niveau que contre-indiquée, non signalée ou signalée à tort, ou une durée de traitement thérapeutique et non législative incorrecte, non relevée ou relevée à tort n'entraînent pas 0 au CTE.

Les réponses attendues, données dans une autre rubrique que celle prévue dans le corrigé, devront être impérativement prises en compte, en étant notées une seule fois.

La commission d'harmonisation de chaque académie pourra attribuer 1 point à chaque conseil pertinent (même non listé dans le corrigé), dans le respect du barème pour les conseils liés aux spécialités et à la (aux) pathologie(s).

Les conseils inadaptés ou aberrants seront sanctionnés par le retrait au maximum de 2 points sur la rubrique 6 « Conseils au patient ».

BP Préparateur en Pharmacie	Code : CNC22SP-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 2/6

1. RECEVABILITÉ (2 points)

L'ordonnance est non recevable car il manque :

- la signature du prescripteur
- la date de naissance de la patiente

(2 ou 0pt)

2. ANALYSE DES SPÉCIALITÉS (8 points)

Nom Dosage DCI	Liste et/ou Législation particulière	Classe pharmacologique et/ou thérapeutique	Indication Thérapeutique	Utilisation et/ou mode d'emploi
PYLERA® Sous-citrate de bismuth potassique 140 mg Métroimidazole 125 mg Tétracycline chlorhydrate 125 mg gélules	Liste I	Associations pour l'éradication d' <i>Helicobacter</i> pylori (0,5pt)	Eradication d' <i>Helicobacter</i> pylori dans le cadre d'un ulcère gastroduodénal (0,5pt)	Les gélules doivent être avalées, <u>après les repas</u> et après une collation au moment du coucher, avec un <u>grand verre d'eau</u> (2x0,5=1pt)
MOPRAL® 20 mg Oméprazole 20 mg Gélules gastro-résistantes	Liste II	Inhibiteur de la pompe à protons (0,5pt) (si IPP seul = 0pt)	En association avec PYLERA® dans l'éradication d' <i>Helicobacter</i> pylori pour la maladie ulcéreuse gastroduodénale (0,5pt)	Prendre <u>matin et soir</u> <u>simultanément</u> avec le PYLERA® pendant 10 jours, avec un demi-verre d'eau (0,5pt) Ne pas <u>mâcher ni croquer</u> <u>les gélules</u> (0,5pt)
LOMEXIN® 600 mg Fenticonazole 600 mg Capsule molle vaginale	Pas de liste	Antifongique et antibactérien de la classe des <u>imidazolés</u> (0,5pt)	Candidose génitale (mycose vaginale acceptée) (0,5pt)	A introduire <u>profondément</u> <u>dans le vagin</u> au coucher et <u>rester allongée</u> (15 mn) <u>Se laver les mains avant et</u> <u>après</u> introduction de la capsule molle (3x0,5=1,5pt)
LOMEXIN® 2% Fenticonazole 2% crème	Pas de liste	Antifongique <u>local</u> <u>imidazolé</u> (0,5pt)	Candidose génitale (mycose vaginale acceptée) (0,5pt)	Appliquer après une toilette intime (0,5pt)
		Total 2 pts	Total 2 pts	Total 4 pts

3. ANALYSE DU DISPOSITIF (3 points)

➤ Description :

Gel pour hygiène intime, sans savon, à pH 8, sans paraben, contenant un antifongique naturel (dérivé du curcuma) et des agents apaisants (2x0,5=1pt)

➤ Indication : Traitement d'appoint des mycoses vaginales (0,5pt)

➤ Mode d'emploi ou d'utilisation :

- À utiliser 1 à 2 fois par jour comme un savon liquide
 - Bien rincer
 - Ne pas poursuivre plus de 15 jours
- (3x0,5=1,5pt)

4. ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION (12 points)

➤ But thérapeutique :

Cette patiente présente un ulcère gastroduodéal, à *Helicobacter pylori*, et une candidose génitale (ou vaginale). (0,5pt)
(0,5pt)
(1pt)

➤ Associations bénéfiques :

Au sein de PYLERA® : 2 antibiotiques (métronidazole et tétracycline) de classes différentes ayant une action complémentaire pour éliminer *Helicobacter pylori*, associés au bismuth (4x0,5=2pts)

PYLERA® et MOPRAL® : 2 médicaments agissant sur 2 composantes de l'ulcère gastroduodéal. PYLERA® élimine la bactérie responsable de l'ulcère et MOPRAL® neutralise l'acidité gastrique et permet la cicatrisation de l'ulcère. (5x0,5=2,5pts)

LOMEXIN® (ovule et crème) et le gel nettoyant : Le LOMEXIN® détruit l'agent responsable de la mycose et le gel, grâce à son pH alcalin, rend le milieu défavorable à son développement. (3x0,5=1,5pt)

LOMEXIN® ovule et crème : Ces 2 formes galéniques permettent la prise en charge à la fois interne et externe de la mycose. (1pt)

➤ Conclusion :

Cette ordonnance ne présente pas d'erreur majeure. (1pt)

➤ Délivrance :

(0 ou 2pts)

PYLERA® gélules : 1 boîte

MOPRAL® 20 mg gélules gastrorésistantes : 1 boîte de 7 et 1 boîte de 14
(ne pas accepter 1 boîte de 30)

LOMEXIN® 600 mg capsules molles vaginales : 1 boîte de 1

LOMEXIN® 2% crème : 1 tube de 15 g

ROGE CAVAILLES INTIME MYCOLEA + gel : 1 flacon

BP Préparateur en Pharmacie	Code : CNC22SP-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 4/6

5. FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE (1point)

Pour les spécialités listées, PYLERA® ET MOPRAL®, reporter la posologie et le mode d'emploi sur les conditionnements. **(1pt ou 0)**

6. CONSEILS AU PATIENT (14 points)

➤ En lien avec les pathologies

Ulcère gastroduodéal : 5 conseils illustrés attendus (5x1=5pts)

- Fractionner l'alimentation en plusieurs repas et prendre les repas à heures fixes, au calme ;
- Bien mâcher pour éviter le brassage trop long dans l'estomac ;
- Éviter les aliments acides (ex : les agrumes, les tomates) ;
- Éviter les aliments irritants (épices, café, alcool, boissons gazeuses...) ;
- Éviter les aliments à temps de brassage long (salade, crudités...) ;
- Éviter le tabac, car augmente l'acidité gastrique ;
- Limiter le stress en pratiquant une activité physique adaptée (natation, marche, yoga) ;
- Éviter de prendre des AINS qui favorisent l'ulcère ;
- Éviter les plats riches en graisse (friture, sauce...) difficiles à digérer ;
- Éviter la prise de boissons et de plats trop chauds.

Tout autre conseil pertinent accepté

Mycose génitale : 5 conseils illustrés attendus (5x1=5pts)

- Privilégier les sous-vêtements en coton pour éviter l'irritation ;
- Éviter les vêtements trop serrés pour éviter la macération ;
- Utiliser au quotidien une solution lavante à usage intime, adaptée au pH vaginal ;
- Prendre une douche et bien sécher après bain de mer et piscine ;
- Éviter les toilettes intimes trop fréquentes et les douches vaginales pour ne pas détruire la flore ;
- Prévenir le partenaire d'un risque de contamination ;
- Éviter les rapports sexuels même protégés ;
- Éviter d'utiliser les coupelles menstruelles, durant les règles, qui favorisent l'humidité ;
- Poursuivre le traitement pendant les règles ;
- Porter une protection pendant le traitement pour protéger les sous-vêtements ;
- Pour éviter les récives, proposer la prise d'un probiotique.

Tout autre conseil pertinent accepté

BP Préparateur en Pharmacie	Code : CNC22SP-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 5/6

➤ **En lien avec les spécialités**

PYLERA® : 2 conseils illustrés attendus

(2x1=2pts)

- Insister sur l'importance de la prise et de la durée du traitement, afin de s'assurer de son efficacité ;
- Les effets indésirables fréquemment rencontrés (sensation de goût métallique dans la bouche, diarrhées, nausées, selles noires) ne justifient pas l'arrêt du traitement ;
- Ne pas consommer d'alcool, car le métronidazole entraîne un effet antabuse ;
- S'assurer que la patiente n'est pas enceinte et n'allait pas car PYLERA® est contre-indiqué dans les deux cas ;
- Signaler au patient le risque d'ulcération œsophagienne (tétracycline).

LOMEXIN® capsules vaginales : 2 conseils illustrés attendus

(2x1=2pts)

Signaler au patient le risque

- de sensations de brûlures ou de prurit,
- d'inactivation d'une contraception spermicide,
- de rupture du préservatif ou du diaphragme en latex.

Tout autre conseil pertinent accepté

BP Préparateur en Pharmacie	Code : CNC22SP-BP PP U32	Session 2022	CORRIGE
Épreuve E3 – U32 : Commentaire technique écrit	Durée : 1 heure	Coefficient 6	Page 6/6